

Cannabis

Ce tableau (**Formes et modes de consommation du cannabis**) est complémentaire aux **Recommandations de base TREKK sur l'intoxication au cannabis**. Ensemble, ils présentent aux professionnels de la santé les renseignements essentiels sur la prise en charge de l'intoxication au cannabis chez le patient pédiatrique à l'urgence.

Produit	Mode de consommation	Effets psychotropes – Apparition et durée	Notes
Cannabis sous forme végétale			
Frais ou séché La « cocotte » ou le « bud » est la fleur desséchée de la plante	Inhalation – fumée ou aérosol	Début : en 10 min Durée : 2-4 h (jusqu'à 24 h)	Les extraits peuvent inclure le « kif », « sift », ou « dry sift »
Comestibles et huiles Les cannabinoïdes sont extraits de la matière végétale dans des huiles ou solvants	Par voie orale	Début : 30-90 min Effet max : 2-3 h Durée : 4-6 h (jusqu'à 24 h)	– Comestibles : ex. bonbons, gâteaux, popcorn, eaux, thés – Attirants pour les enfants – Produits en vente sur le marché indiquent la teneur en THC:CBD – Produits cuisinés maison : dose difficile à déterminer
Extraits liquides à base d'alcool (« teintures ») La matière végétale est imbibée d'alcool et filtrée	Sous la langue	Début et durée intermédiaires	
Résine – haschisch Les fleurs du cannabis sont soumises à un processus d'extraction pour obtenir une résine qui est ensuite chauffée et pressée. La résine est mélangée à un solvant (ex. butane, dioxyde de carbone, voir ci-dessous)			
Résine – extraction au butane <ul style="list-style-type: none"> • Shatter, glass, slab, sheet • Cire, wax crumble, earwax, flake, budder • Huile, honey oil, hash oil, BHO 	« Dabbing » (huile ou « dab rig »); Vaporisation	Début : en 10 min Durée : 2-4 h (jusqu'à 24 h)	Tamponnage (« dabbing ») : petite quantité de concentré déposée sur une surface très chaude, vaporisée, puis inhalée à l'aide d'une pipe en verre, pipe à dab, « dab rig »
Résine – extraction au dioxyde de carbone <ul style="list-style-type: none"> • Huile au CO₂ 	Dabbing (huile ou dab rig); Vaporisation	Début : en 10 min Durée : 2-4 h (jusqu'à 24 h)	Voir dabbing, ci-dessus
Résine – extraction à l'eau <ul style="list-style-type: none"> • Bubble hash • Hasch sans solvant • Ice wax 	Joint; « Bong »; Vaporisation	Début : en 10 min Durée : 2-4 h (jusqu'à 24 h)	
Joints, pipes, bongs, vapoteurs Joint : bud roulé dans du papier et fumé Pipe : Le cannabis est soumis à une flamme et la fumée est inhalée Bong : L'eau qui le remplit rafraîchit la fumée qui y passe Vaporisation : le produit est chauffé jusqu'au stade de vapeur	Fumer; Inhalation; Vaporisation	Début : en 10 min Durée : 2-4 h (jusqu'à 24 h)	

Cannabinoïdes pharmaceutiques			
Nabilone – capsules	Par voie orale	Début : 1 h Durée : 8-9 h	
Dronabinol – comprimés	Par voie orale	Début : 30-60 min Durée : 4-6 h	
Nabiximols (Sativex®) – vaporisateur	Vaporisateur buccal	Début : 30-60 min Durée : 1-6 h	
Cannabinoïdes de synthèse			
Agonistes des récepteurs CB1 et CB2 – ont souvent plus d’affinité pour le récepteur CB et agissent comme agonistes complets. Plus 600 cannabinoïdes illicites. Vaporisés sur la matière végétale (ex. K2, Spice, Incense, Potpourri)	Principalement inhalation et ingestion	Début : variable Durée : variable	Symptômes semblables à l’intoxication. Sécurité non établie. Effets indésirables sur le système hépatique, cardiovasculaire, et d’anticoagulation
<p>Information générale : La plante Cannabis contient > 100 phytocannabinoïdes, dont les 2 principaux sont le delta-9-tétrahydrocannabinol (Δ^9-THC, ou THC) et le cannabidiol (CBD). Le rapport THC:CBD varie selon la variété et la culture. Le cannabis à des fins récréatives a un rapport THC:CBD élevé. Le cannabis à des fins médicales varie d’un rapport CBD:THC élevé à un rapport THC:CBD élevé. Le cannabis réglementé indique la teneur en CBD et en THC sur l’emballage. La vaporisation peut inclure le vapotage.</p>			

Le but du présent document est de fournir aux professionnels de la santé les faits et recommandations clés sur l’intoxication au cannabis. Ce sommaire est produit par les conseillers en matière d’intoxication au cannabis pour le réseau TREKK, Dr Kaitlin Hogue du *Health Sciences Centre Children’s Hospital* de Winnipeg et Dr Neil Desai du *BC Children’s Hospital*, et Danica Irwin du Centre Hospitalier pour enfants de l’Est de l’Ontario (CHEO). Il s’agit des meilleures connaissances disponibles au moment de la parution de ce bulletin. Par contre, les professionnels de la santé devraient continuer à utiliser leur propre jugement et prendre en considération le contexte, les ressources et les autres facteurs pertinents. Le réseau TREKK ne sera pas responsable des pertes, demandes d’indemnisation, dettes, coûts ou obligations liés à l’utilisation du présent document, y compris des pertes ou dommages découlant de réclamations d’une tierce partie. De plus, le réseau TREKK n’assume aucune responsabilité pour les changements apportés au présent document sans son autorisation.

Le tableau **Formes et modes de consommation du cannabis** s’appuie sur : *Essential Cannabis Knowledge for Pharmacists*, Ontario Pharmacists Association, Module 3. Author: Mike Beazely, Associate Professor, University of Waterloo Faculty of Pharmacy.

